

Jakdona rosa 8 RG s.121-125





Juntunfunin





obintualmentadorimilantual

ANNEE 1988 NOM Yahdona 2000a EMPLACEMENT

8 R6 s 121. 125 m

duntanlantanlantanlantanl

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	oraisc mi/f	Vé début	raison mi/v	Maturité
1 2 3 4	43372	28.3 25.3	£ 1.4 28.3 28.3	0	0				

Pourriture: Port: engi Vigueur: 15 faible

ANNEE 1989 NOM Jakdona rosa EMPLACEMENT 8 RG s 121-125

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f		raison mi/v		Maturité
1	2	133	16.3 +	Ô							
2. \$ 3 4. \$	2	\$ 3	j3 3 ⊭	0	0 "						
5 &						1					
Pou	rritur			Mill. :		Port :	ani'	V	igueur	: 1	-

ANNEE 1991

NOM Tana safidoh EMPLACEMENT 8 R6 s 126.130

dintadantialantadantad

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f	fin		raison mi/v		Maturité			
1 2	4		0										
4 5	5		0	Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M - C Pour: Mill: Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus									
	,		; ; ;	Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène									
	and the second section of the second		- Manuscript	Port:		V	igueur	er					

NOM Yakdona rosa EMPLACEMENT 8 Rg 6 1 121. 125

Jouche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-	Floraison debut, mi/f	fin	Vér début	mi./v	fin	Maturitá
	2		15.3.	0							
3	4		15.34	0	Grappe	s G - M - P	Dira		Compac	-i+6	T - N - C
3)			; ;		Four :	Mill TG - G - M - disc-sph-ell	<u>l</u> : - P <u>D</u> :	im :			
	Dl.	15.3	91		Saveur Põpins	: 8-Gr-Rs-I : s - m - an : avec - apy	r - fo grěne	ox - he	rb		oloré
			; ; ; ;	1	Port	t enige.	V	igueur	: 1	5	
	and a second sec	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Administration of the second o								

ANNEE 1992 NOM Jakdona rosa EMPLACEMENT 8 R6 1121-125 Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Souche 0 1 2 0 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Pour : Mill : 4 10 Baie: TG - G - M - P Dim: 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

idintanlantialartanlantarl

MCM Yahdona rosa

MOM Yakdona rosa EMPLACEMENT 8 R6 A 121.125

ouche	Nbre yeux	rremont mi/déb		Ferti- lité	Flo: début	raison mi/f			raison mi/v	£in	Maturit é
1 2 } 3 4 }	2		0	Couleur Pépins Port :	TG - \ disc-s r : R-C r : s - r : avec	Mil. Sph-el. Gr-Rs-l m - a. c - apy	l ; - P D. 1-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy <u>Jus</u>	rl-fus : inc		L - M -C

HOM Jakdona rosa EMPLACIONET 8 RG A 121.125

abantandantandantandantand

iche	Whre yeux	Débou	rrament mi/deb	tibre quap	Forti-	T'lo debut	raison ml/E		ve: debut	mi/v	ttatur II.
1 2 3 4 5	2 + 2 + 2	4,3	28:25 M13 ×	0	Grappe Four : Baic : Couleu Saveur Fépins Fort :	TC - C disc-sp r : B-C - : s -	Mil ; - !! oh-ell ir-Rs- m - a	1 : - P - OV-O RG-N r - fo	Dim: hov-cy <u>dus</u> ox - he	l-fus : fuc erb	: 1, - 11 C

N° d'ordre : Jankdona rosa el 8 R6 s 121-125 (s.121) Désignation : Emplacement : (A) BOURGEONNEMENT Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184. Glabre (850- séteux 186 - velouté 187 - aranéeux (188) - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente (278) - sans villosité laineuse (279).

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert (198).

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

idantanlantinlaatuuluutuud

Etalées - en gouttière - autres. Face inférieure glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281. Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283

Limbe : glabre 220 - séteux 22) velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 784 sans villosité laineuse 285/.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 285 2 velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287).

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo87

N° d'ordre :

42

Désignation : Emplacement :

Jakdona rosa 8 R6 s-121-125 (s.123)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dinatan lantija kartan lantind

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre (42) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 28 - sans villosité laineuse 28. Entièfement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies (4) - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 20 leg colorés : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 258 ou leg colorés Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

verte 260 - jaune 261 - rouge clair 263 rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264) - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Lalvo 86

Jakdona rosa 8 R6s-121-125 s-3

ilintanlantanlantanlantanl

Désignation : Emplacement :

N° d'ordre :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvosq

Jakdona rosa 8 R6 s 121. 125 p. 1 (un fen faible ne pource fas bien) DENOMINATION : EMPLACEMENT SARMENT DE VIGNE : long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 40 ... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (6) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). . . marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -

rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2)

: saillant (1) - efface(2)

Yeux

dintanlantialaataalantaal

-Calvo92

N° d'ordre : Jakdona noja Emplacement : 8 R 6 A 121 - 125

44

```
: 1 -(2)- 3
Angle des nervures
                                 : 4 - 5 - 6
Sexe
                                 : 7-(8) - 9
L_1/L_2
                                 : (10) - 11
L2/L
                           : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
: 17 - 18 - 19 - 20
Nombre de lobes
Prof. sinus latéral Sup.
                                : 25 - (26) - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                 : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                         : 31 - (32) - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270
                                 : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                 : 40 - 41 : 42 - 43 - 44
Dents : forme
Dents (angle)
                                 : (45) - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                 : 63 - 64 - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90

ilantanlaatiidontaalaatuul